



Phá Thai Nội Khoa là gì?

Phá thai nội khoa là phương pháp được FDA chấp thuận để chấm dứt thai kỳ sớm. Phương pháp này bao gồm dùng hai loại thuốc: mifepristone, là thuốc chặn một loại hormone cần thiết cho thai kỳ tiếp tục phát triển và misoprostol, là thuốc gây ra các cơn co thắt để đẩy thai ra. Mifepristone và misoprostol có thể được cung cấp bởi một chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc mua từ một nhà thuốc theo toa thuốc.

Quý vị dùng misoprostol trong 24 đến 48 giờ sau khi uống mifepristone. Quý vị có thể phá thai nội khoa khi tuổi thai được tối đa 10 tuần tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng.

Thuốc gốc Mifepristone của GenBioPro có thể được kê bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị theo quy định của FDA. Trước khi quý vị sử dụng thuốc, nhà cung cấp của quý vị phải xác nhận rằng tuổi thai của quý vị là trong vòng 70 ngày kể từ

ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng và rằng quý vị đủ điều kiện thích hợp để phá thai nội khoa. Quý vị cũng phải xem xét và ký Mẫu Chấp Thuận Của Bệnh Nhân do FDA yêu cầu, nêu rõ rằng quý vị đã đọc và hiểu các rủi ro tiềm ẩn của việc điều trị.

Xin đọc tập sách này để biết thông tin về những rủi ro khi điều trị bằng mifepristone; nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị và xem lại Hướng Dẫn Dùng Thuốc kèm theo tập sách này.



GenBioPro

MANG THUỐC TỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Phá Thai Nội Khoa Có Một Lịch Sử Lâu Dài

Mifepristone, còn được gọi là thuốc phá thai hay RU-486, được phát triển vào năm 1980 và được sử dụng ở Pháp vào năm 1988. Kể từ đó, phương pháp này đã được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu; đã được sử dụng an toàn và hiệu quả ở Mỹ trong hơn 20 năm. Năm 2019, GenBioPro giới thiệu một phiên bản thuốc gốc của mifepristone. FDA xác định rằng đó là một loại thuốc an toàn và hiệu quả tương đương với thuốc viên có thương hiệu.

Được sử dụng an toàn và hiệu quả tại Mỹ trong hơn 20 năm

Được hàng triệu phụ nữ sử dụng trong suốt hơn 30 năm

Phá Thai Nội Khoa Rất Phổ Biến

Mặc dù nhiều người không nói về việc phá thai, nhưng nó rất phổ biến. Đến tuổi 45, khoảng một nửa phụ nữ Hoa Kỳ mang thai ngoài ý muốn và một phần tư trong số họ sẽ phá thai.¹ Mỗi năm tại Hoa Kỳ, hơn 300,000 phụ nữ xử lý việc mang thai ngoài ý muốn bằng phá thai nội khoa. Tính đến năm 2022, ước tính có 5 triệu người ở Mỹ đã sử dụng mifepristone để phá thai nội khoa.

Phá Thai Nội Khoa Dễ Dàng

Phá thai nội khoa không mang tính xâm lấn và quý vị cùng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình chọn địa điểm và thời gian quý vị sẽ dùng thuốc. Quý vị có thể yêu cầu gửi mifepristone, misoprostol và các thuốc khác trực tiếp đến cho quý vị qua đường bưu điện vì các tác dụng phụ. Nhiều người thích cách đơn giản và hiệu quả này khi chọn phá thai sớm.

Quý vị chọn địa điểm và thời gian

Những Ai Không Nên Dùng Mifepristone?

Một số phụ nữ không nên dùng mifepristone. Không nên dùng mifepristone nếu quý vị:

- Có thai hơn 70 ngày (10 tuần).
- Đang sử dụng IUD (dụng cụ hoặc hệ thống đặt trong tử cung). Phải tháo IUD trước khi dùng mifepristone.
- Đã được nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của quý vị thông báo rằng quý vị mang thai bên ngoài tử cung (thai ngoài tử cung).
- Tuyến thượng thận của quý vị có vấn đề (suy thượng thận mạn tính).
- Uống thuốc sẽ làm loãng máu.
- Có vấn đề về chảy máu.
- Bị bệnh rối loạn chuyển hóa Porphyria.
- Dùng một số loại thuốc steroid.
- Bị dị ứng với mifepristone, misoprostol hoặc các loại thuốc có chứa misoprostol, như Cytotec hoặc Arthrotec.

Độ An Toàn Của Phương Pháp Phá Thai Nội Khoa

FDA đã đánh giá kỹ lưỡng về phương pháp phá thai nội khoa và khẳng định rằng đó là phương pháp tin cậy và hiệu quả. Biến chứng nghiêm trọng của phá thai nội khoa là rất hiếm, xảy ra với khoảng 3 trên 1000 người.² Đáng tiếc là những thông tin sai lệch về phá thai nội khoa có thể gây ra nhầm lẫn và quan ngại. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải ghi nhớ những rủi ro nghiêm trọng thực sự vẫn có. Xem các trang sau để biết thêm thông tin về những rủi ro này, đọc Hướng Dẫn Dùng Thuốc kèm theo và thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Ngoài việc cung cấp một loại thuốc gốc mifepristone an toàn và giá cả phải chăng, GenBioPro cam kết sẽ phổ biến để mọi người biết về sự an toàn và hiệu quả của thuốc này trong điều trị kết thúc thai kỳ.

Tỷ lệ biến chứng rất thấp (dưới 0.5%)

97% hiệu quả xét về tổng thể

Phá Thai Nội Khoa Rất Hiệu Quả

Mifepristone, khi được sử dụng kết hợp với misoprostol, rất hiệu quả trong việc kết thúc thai kỳ sớm. Phương pháp này thành công trong 97% trường hợp xét về tổng thể. Đó là mức trung bình của tỷ lệ thành công 93-98%, điều này phụ thuộc vào khoảng thời gian mang thai. Chấm dứt sớm hơn, dưới 49 ngày của thai kỳ, có tỷ lệ thành công cao nhất: 98%. Chấm dứt muộn hơn, gần 70 ngày mang thai, có tỷ lệ thành công thấp nhất: 93%. Một tỷ lệ nhỏ phụ nữ, khoảng 2-7%, sẽ cần làm thủ thuật phẫu thuật tiếp theo để kết thúc thai kỳ hoặc cầm máu chảy quá nhiều.³

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng thai kỳ của quý vị đã kết thúc sau 7 đến 14 ngày sau khi dùng mifepristone và misoprostol. Nếu quý vị vẫn đang mang thai, hoặc có vấn đề về chảy máu, quý vị sẽ được trao đổi về các bước tiếp theo.

GenBioPro Luôn Sẵn Sàng Trợ Giúp

GenBioPro là một công ty dược phẩm chuyên sản xuất các sản phẩm cải thiện sức khỏe sinh sản. Công ty dược thành lập dựa trên niềm tin rằng tất cả mọi người, bất kể thu nhập, giới tính, chủng tộc hay vị trí địa lý đều có quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản với giá cả phải chăng, kể cả việc phá thai nội khoa. Chúng tôi luôn đồng hành hỗ trợ quý vị.



GenBioPro

MANG THUỐC TỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Nguồn tài liệu

1. RK Jones, M Kirstein, and J Philbin. Abortion incidence and service availability in the United States, 2020. *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 2022;54:128-41.
2. U Upadhyay et al. Incidence of emergency department visits and complications after abortion. *Obstetrics & Gynecology*, 2015;125:175-83.
3. MJ Chen and MD Creinin. Mifepristone with buccal misoprostol for medical abortion: A systematic review. *Obstetrics & Gynecology*, 2015;126:12-21.

Có Rủi Ro Khi Phá Thai Nội Khoa Không?

Mặc dù chuột rút và chảy máu nằm trong các nguy cơ dự kiến của việc chấm dứt thai kỳ, nhưng hiếm khi xảy ra chảy máu nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng; nhiễm trùng hoặc các vấn đề khác có thể xảy ra sau sảy thai, phá thai bằng phẫu thuật, phá thai nội khoa hoặc sinh con. Nhận chăm sóc y tế càng sớm càng tốt là cần thiết trong những trường hợp này. Nhiễm trùng nặng dẫn đến tử vong xảy ra trong một số rất ít trường hợp. Không có thông tin về việc sử dụng mifepristone và misoprostol dẫn tới tử vong như vậy. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc, mối quan ngại hoặc vấn đề nào, hoặc nếu quý vị lo lắng về bất kỳ tác dụng phụ hoặc triệu chứng nào, hãy nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Các tác dụng phụ thường gặp nhất của điều trị phá thai bằng mifepristone bao gồm: buồn nôn, óm yếu, sốt/ớn lạnh, nôn mửa, nhức đầu, tiêu chảy và chóng mặt. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể giúp quý vị kiểm soát bất kỳ cơn đau nào hoặc tác dụng phụ khác.

Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể có của mifepristone. Để biết thêm thông tin về những rủi ro khi điều trị bằng mifepristone, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị và xem lại Hướng Dẫn Dùng Thuốc kèm theo tập sách này.

Hãy đảm bảo rằng quý vị sẽ liên lạc ngay với nhà cung cấp của mình nếu gặp bất kỳ vấn đề nào sau đây:

Chảy Máu Nghiêm Trọng.

Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị ngay lập tức nếu quý vị chảy máu thối hết toàn bộ hai băng vệ sinh mỗi giờ trong hai giờ liên tiếp hoặc nếu quý vị lo lắng về việc bị chảy máu quá nhiều.

Đau Bụng hoặc "Cảm Thấy Bị Ốm Bệnh"

Nếu quý vị bị đau bụng hoặc khó chịu, hoặc quý vị "cảm thấy ốm bệnh", bao gồm óm yếu, buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy, có hoặc không sốt, hơn 24 giờ sau khi dùng misoprostol, quý vị nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình ngay lập tức. Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng nặng hoặc một vấn đề khác (bao gồm mang thai ngoài tử cung, có phôi thai nằm ngoài tử cung).

Sốt.

Trong những ngày sau khi điều trị, nếu quý vị bị sốt từ 100.4°F trở lên kéo dài hơn 4 giờ, quý vị nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình ngay lập tức. Sốt có thể là triệu chứng của nhiễm trùng nặng hoặc một vấn đề khác.

Nếu không thể đến khám với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình, quý vị hãy đến phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất.



GenBioPro

MANG THUỐC TỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI