


# CÓMO TOMAR LOS COMPRIMIDOS

## DÍA 1

Comience con el comprimido de mifepristona.




Trague el comprimido.



## DÍA 2-3

Tome los comprimidos de misoprostol según las instrucciones de su proveedor de atención médica.



Coloque 2 comprimidos de misoprostol entre la mejilla y las encías en cada lado de la boca (4 comprimidos en total).

Espere 30 minutos y, después, trague lo que quede de los comprimidos.



Para los dolores o cólicos, tome los medicamentos recomendados por su proveedor de atención médica.



Si su proveedor de atención médica le dijo que tome otra dosis de misoprostol, siga sus instrucciones:

---



---



---



---

Su proveedor de atención médica puede recomendarle otro medicamento.

**Tome comprimidos**  
de \_\_\_\_\_ ,  
\_\_\_ cada \_\_\_ horas.


Si necesita un método anticonceptivo:




Es posible quedar embarazada en las 2 semanas posteriores a un aborto médico. Si necesita un método anticonceptivo, su proveedor de atención médica puede ayudarle a decidir qué método puede ser el mejor para usted.

## EN LAS SEMANAS SIGUIENTES

Se espera que experimente un sangrado/manchado vaginal durante un promedio de 9 a 16 días.



Los cólicos deberían desaparecer.



Realice un seguimiento con su proveedor de atención médica aproximadamente de 7 a 14 días después del primer comprimido.



**Esta no es toda la información importante de seguridad asociada al uso de mifepristona y misoprostol. Consulte la GUÍA DE MEDICAMENTOS y la INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN.**