


CUÁNDO LLAMARNOS

Empapa **dos compresas higiénicas por hora** en el plazo de **dos horas seguidas**.



Tiene dolor y los analgésicos no ayudan.



Náuseas, dolor, fiebre, diarrea, tiene náuseas más de 24 horas después de tomar el misoprostol.



Le preocupa tener que ir al hospital.



QUÉ PUEDE SUCEDER

EFFECTOS SECUNDARIOS FRECUENTES DE LA MIFEPRISTONA/DEL MISOPROSTOL

Los efectos secundarios frecuentes, además de los cólicos, incluyen náuseas, debilidad, vómitos, dolor de cabeza, diarrea, mareos, fiebre y escalofríos.



Después de tomar el misoprostol, es normal tener cólicos, sangrados y algunos efectos secundarios.



SANGRADO Y CÓLICOS NORMALES


Algunas sangran poco.



Algunas sangran más que en un período menstrual.



Algunos coágulos pueden ser tan grandes como el tamaño de un limón.



Puede tener sangrados leves por hasta 4 semanas.

LLAME A SU PROVEEDOR MÉDICO AL

(_____) _____ - _____

Esta no es toda la información importante de seguridad asociada al uso de mifepristona y misoprostol. Consulte la GUÍA DE MEDICAMENTOS y la INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN.