

Decidir terminar su embarazo

La decisión de terminar un embarazo no deseado puede ser estresante y difícil. Comprendemos. GenBioPro y su proveedor de atención médica están aquí para ayudarla.

Si decide terminar su embarazo en los primeros meses, el aborto médico es una forma segura y efectiva de hacerlo. Aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), ha sido utilizado con éxito en los Estados Unidos durante más de veinte años por más de cinco millones de personas como usted.

Prepararse para un aborto médico

Antes de seguir adelante con su aborto médico, le recomendamos que se prepare siguiendo los pasos a continuación:

- Asegúrese de tener suficientes tampones o toallitas a mano para cuando tome el misoprostol (ver el Día 3 en el interior).
- Pregúntele a su proveedor de atención médica acerca de los medicamentos para tratar los síntomas.
- Hable con su proveedor de atención médica acerca de tomar el misoprostol en un día libre para que no tenga que lidiar con cólicos y sangrado mientras está en el trabajo o en la escuela (ver el Día 3 en el interior de este folleto para obtener más detalles sobre la duración de los calambres y el sangrado).
- Hable con amigos de confianza o familiares para que estén al tanto de su próximo aborto médico y puedan apoyarla durante el proceso.
- Si tiene hijos, considere establecer una cobertura de cuidado infantil para el día después de tomar el misoprostol. Los amigos y la familia pueden ser excelentes recursos, incluso si solo están pasando el fin de semana con usted para ayudar con el cuidado de los niños y las tareas domésticas.

CREEMOS LO SIGUIENTE:

Tiene derecho a determinar su futuro. Usted es la única persona con suficiente información para tomar decisiones personales sobre la atención médica que sean mejores para usted y su familia.

¿Hay riesgos en tomar la píldora abortiva?

Si bien los cólicos y el sangrado son una parte esperada de la interrupción del embarazo, en raras ocasiones, pueden ocurrir sangrados graves, potencialmente mortales, infecciones u otros problemas después de un aborto espontáneo, un aborto quirúrgico, un aborto médico o un parto. En estas circunstancias, es necesario buscar atención médica lo antes posible. La infección grave ha provocado la muerte en muy pocos casos. Se desconoce si el uso de mifepristona y misoprostol ha causado estas muertes. Si tiene preguntas, inquietudes o problemas, o si le preocupan los efectos secundarios o los síntomas, debe comunicarse con su proveedor de atención médica.

Los efectos secundarios más frecuentes del tratamiento con mifepristona incluyen: náuseas, debilidad, fiebre/escalofríos, vómitos, dolor de cabeza, diarrea y mareos. Su proveedor le dirá cómo controlar el dolor u otros efectos secundarios.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de mifepristona. Para obtener información adicional sobre los riesgos del tratamiento con mifepristona, hable con su proveedor de atención médica y revise la Guía del medicamento que acompaña a este folleto.



SU ABORTO MÉDICO:

Qué esperar

Este folleto pretende complementar la información proporcionada en la Guía del medicamento que se adjunta.



GenBioPro

PONER EL ACCESO EN PRÁCTICA

© 2023, GenBioPro, Inc. Todos los derechos reservados.
GBP-MIF-634 01/23



GenBioPro

PONER EL ACCESO EN PRÁCTICA

PASOS CLAVE EN SU ABORTO MÉDICO:



Su proveedor de atención médica le pedirá que lea y firme un Acuerdo de la paciente y le dará una Guía del medicamento, instrucciones e información de contacto.

Su proveedor de atención médica le indicará cómo tomar el comprimido de mifepristona en el primer día y analizará cómo y cuándo tomar los comprimidos de misoprostol.

Le darán un comprimido de mifepristona y cuatro comprimidos de misoprostol, o una receta para que los obtenga en una farmacia.



24 a 48 horas después de tomar mifepristona, tomará los comprimidos de misoprostol colocando dos en cada una de las cavidades de las mejillas. Deje que los comprimidos se disuelvan durante 30 minutos. Trague todo lo que quede con líquido. Consulte la Guía del medicamento para obtener instrucciones detalladas.

En un plazo de 2 a 24 horas, puede esperar cólicos y sangrado seguidos de manchas, que pueden durar varios días.

Consulte el cuadro a continuación para conocer los síntomas que requieren atención médica inmediata.



Es importante hacer un seguimiento con su proveedor de atención médica para asegurarse de que su aborto haya sido exitoso y que ya no esté embarazada.

Aunque el aborto médico es muy efectivo para terminar el embarazo, aproximadamente 2 a 7 de cada 100 personas necesitarán un procedimiento quirúrgico de seguimiento para terminar su embarazo o para detener el sangrado excesivo.



Puede volver a quedar embarazada poco después de que su embarazo termine. Si no desea volver a quedar embarazada, puede comenzar a usar píldoras anticonceptivas, un parche o un anillo el día después de tomar misoprostol.

Su proveedor de atención médica puede ayudarla a explorar opciones, a elegir el mejor método anticonceptivo para usted y puede informarle cuándo es mejor comenzar a usarlo.

¿Necesita más información?

Si tiene más preguntas sobre el aborto médico, la mifepristona, qué esperar o su experiencia después del tratamiento, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Mi proveedor de atención médica:

Número de teléfono:

Es normal buscar apoyo adicional durante el proceso de su aborto médico.

Para obtener una lista de recursos recomendados, visite www.genbiopro.com/patients.

Asegúrese de comunicarse con su proveedor rápidamente si tiene alguno de los siguientes:

Sangrado abundante

Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si sangra lo suficiente como para empapar dos toallas sanitarias gruesas de tamaño normal por hora durante dos horas consecutivas o si está preocupada por un sangrado abundante.

Dolor abdominal o “Ganas de vomitar”

Si tiene dolor o malestar abdominal, o tiene “ganas de vomitar”, incluyendo debilidad, náuseas, vómitos o diarrea, con o sin fiebre, más de 24 horas después de tomar misoprostol, debe

comunicarse con su proveedor de atención médica sin demora. Estos síntomas pueden ser un signo de una infección grave u otro problema (incluido un embarazo ectópico, un embarazo fuera del útero).

Fiebre

En los días posteriores al tratamiento, si tiene fiebre de 100.4 °F o más que dura más de 4 horas, debe comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato. La fiebre puede ser un síntoma de infección grave u otro problema.

Si no puede comunicarse con su proveedor de atención médica, vaya a la sala de emergencias del hospital más cercano.