

Decidir interromper sua gravidez

A decisão de interromper uma gravidez indesejada pode ser estressante e difícil. Nós entendemos. A GenBioPro e o seu prestador de serviços de saúde estão aqui para ajudar.

Se você decidir encerrar sua gravidez e ela estiver em estágio inicial, o aborto medicamentoso é uma maneira segura e eficaz para fazer isso. Aprovado pela FDA, já foi usado com sucesso nos Estados Unidos por mais de vinte anos por mais de cinco milhões de pessoas como você.

Preparação para um aborto medicamentoso

Antes de prosseguir com seu aborto medicamentoso, recomendamos que você se prepare seguindo os seguintes passos:

- Certifique-se de que você tenha muitos absorventes higiênicos ou internos à mão para quando você tomar o misoprostol (veja as informações do Dia 3 neste folheto).
- Pergunte ao seu prestador de serviços de saúde sobre medicamentos para tratar os sintomas.
- Converse com o seu prestador de serviços de saúde sobre tomar o misoprostol em um dia de folga para que você não tenha que lidar com cólicas e sangramentos no trabalho ou na escola (veja as informações do Dia 3 neste folheto para saber mais sobre o período de cólicas e sangramento).
- Converse com amigos ou familiares de confiança para que eles estejam cientes que você irá realizar um aborto medicamentoso e para que eles possam ajudá-la durante o processo.
- Se você tiver filhos, organize-se para que alguém tome conta deles no dia em que você tomar o misoprostol. Amigos e familiares podem ser uma grande ajuda, mesmo que estejam apenas passando o fim de semana com você, para ajudar com as crianças e as tarefas domésticas.

ACREDITAMOS QUE:

Você tem o direito de determinar seu futuro.

Você é a única com informações suficientes para tomar decisões de cuidados de saúde pessoais melhores para você e sua família.

Há riscos em tomar a pílula de aborto?

Embora cólicas e sangramentos sejam uma parte esperada da interrupção de uma gravidez, sangramentos sérios e potencialmente de risco à vida, infecções ou outros problemas raramente ocorrem após um aborto espontâneo, aborto medicamentoso, aborto médico ou parto. É necessário procurar atendimento médico o mais rápido possível nessas circunstâncias. Infecções sérias resultaram em morte em um número muito pequeno de casos. Não há informações de que o uso da mifepristona e do misoprostol tenha causado essas mortes. Se você tiver alguma dúvida, preocupação ou problema, ou se estiver preocupada com algum efeito colateral ou sintoma, você deve entrar em contato com seu prestador de serviços de saúde.

Os efeitos colaterais mais comuns do tratamento com a mifepristona incluem: enjoo, fraqueza, febre/calafrios, vômito, dor de cabeça, diarreia e tontura. Seu prestador de serviços de saúde explicará para você como controlar qualquer dor ou outros efeitos colaterais.

Existem outros efeitos colaterais possíveis da mifepristona. Para obter mais informações sobre os riscos do tratamento com a mifepristona, converse com seu prestador de serviços de saúde e consulte o Guia do medicamento que acompanha este panfleto.



SEU ABORTO MEDICAMENTOSO:

O que esperar

Esta brochura destina-se a complementar as informações fornecidas no Guia do medicamento que a acompanha.



GenBioPro

COLOCANDO O ACESSO EM PRÁTICA

© 2023, GenBioPro, Inc. Todos os direitos reservados.
GBP-MIF-694 03/23



GenBioPro

COLOCANDO O ACESSO EM PRÁTICA

PRINCIPAIS ETAPAS EM SEU ABORTO MEDICAMENTOSO:



Seu prestador de serviços de saúde pedirá que você leia e assine um Acordo da paciente e dará a você o Guia do medicamento, bem como instruções e informações de contato.

Seu prestador de serviços de saúde explicará para você como tomar o comprimido de mifepristona e discutirá como e quando tomar os comprimidos de misoprostol.

Você receberá um comprimido de mifepristona e quatro comprimidos de misoprostol, ou uma receita para adquiri-los em uma farmácia.



24 a 48 horas após tomar a mifepristona, você tomará o misoprostol colocando dois comprimidos em cada lateral da boca na região das bochechas (4 comprimidos no total). Deixe as pílulas se dissolverem por 30 minutos. Engula tudo o que sobrar com líquido. Consulte o Guia do medicamento para obter instruções detalhadas.

Dentro de 2 a 24 horas, você pode esperar cólicas e sangramento seguidos por escapes, que podem durar vários dias.



Veja o quadro abaixo sobre sintomas que exigem atenção médica imediata.

É importante fazer um acompanhamento com seu prestador de serviços de saúde para garantir que o aborto tenha sido bem-sucedido e que você não esteja mais grávida.

Embora o aborto medicamentoso seja muito eficaz no encerramento da gravidez, cerca de 2 a 7 em cada 100 pessoas precisarão de um procedimento cirúrgico de acompanhamento para encerrar a gravidez ou parar o sangramento excessivo.



Você pode engravidar novamente logo após a interrupção de uma gravidez. Se você não quiser engravidar novamente, você pode começar a usar anticoncepcionais em forma de pílulas, adesivo ou anel no dia seguinte à administração do misoprostol.

Seu prestador de serviços de saúde pode ajudá-la a explorar opções, escolher o melhor método contraceptivo para você e dizer a melhor hora para começar a usá-lo.

Precisa de mais informações?

Se você tiver mais dúvidas sobre o aborto medicamentoso, a mifepristona, o que esperar ou sua experiência após o tratamento, entre em contato com seu prestador de serviços de saúde.

Meu prestador de serviços de saúde:

Número de telefone:

É normal buscar mais apoio durante o processo de aborto medicamentoso.

Para obter uma lista de recursos recomendados, acesse www.genbiopro.com/patients

Entre em contato com o seu prestador de serviços de saúde imediatamente se você apresentar algum dos seguintes sintomas:

Sangramento intenso

Entre em contato com o seu prestador de serviços de saúde imediatamente se você sangrar o suficiente para encharcar dois absorventes grossos de tamanho grande por hora por duas horas consecutivas ou se estiver preocupada com um sangramento intenso.

Dor abdominal ou "mal-estar"

Se você sentir dor ou desconforto abdominal ou se estiver sentindo "mal-estar", inclusive fraqueza, enjoo, vômito ou diarreia, com ou sem febre, mais de 24 horas após tomar o

misoprostol, você deve entrar em contato com seu prestador de serviços de saúde imediatamente. Esses sintomas podem ser um sinal de uma infecção séria ou outro problema (inclusive uma gravidez ectópica, que é uma gravidez fora do útero).

Febre

Nos dias seguintes ao tratamento, se você tiver febre de 38 °C ou mais que dure mais de 4 horas, você deve entrar em contato com seu prestador de serviços de saúde imediatamente. A febre pode ser um sintoma de uma infecção séria ou outro problema.

Se você não conseguir entrar em contato com seu prestador de serviços de saúde, vá ao pronto-socorro mais próximo.